

INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY W PRZEPROWADZENIU ZABIEGU SKLEROTERAPII

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA / PACJENTKI

.....

PESEL

Podstawowe informacje dotyczące zabiegu skleroterapii

Pod pojęciem skleroterapii (leczenia obliterującego) rozumiemy zaplanowane i wybiórcze wstrzykiwanie do żyłaków/żył siatkowatych/„pajęczków naczyniowych” substancji, która wywołuje w nich uszkodzenie śródbłonna wskutek czego dochodzi do ich zamknięcia.

Żyłaki kończyn dolnych nie są stanem bezpośredniego zagrożenia życia, niemniej jednak stwarzają one ryzyko powikłań takich jak: zapalenia żył głębokich, owrzodzenie goleni czy zatorowość płucna. Przyjętymi metodami postępowania są klasyczne zabiegi chirurgiczne, procedury skleroterapii, laserowe operacje żyłaków metodą EVLT, a także kompresjoterapia. Leczenie zabiegowe „pajęczków naczyniowych” z medycznego punktu widzenia nie jest obowiązkowe. Alternatywną metodą postępowania jest kompresjoterapia lub laseroterapia.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu skleroterapii.

- a) bezwzględne; unieruchomienia, powierzchniowe lub głębokie zakrzepice naczyń żylnych, znana alergia na środki obliterujące (Polidokanol = Aethoxysclerol), ciąża, ciężka choroba układowa, miejscowa lub uogólniona infekcja, miażdżycza zarostowa tętnic kończyn dolnych.
- b) względne: cukrzyca, obrzęki goleni, astma oskrzelowa oraz inne choroby alergiczne, trombofilia.

UWAGA: Należy zgłosić lekarzowi jeżeli występuje jakikolwiek z powyższych powodów.

Możliwość wystąpienia powikłań

Nie istnieją w medycynie procedury zabiegowe, które choćby teoretycznie nie wiązałyby się z ryzykiem powikłań – dotyczy to także leczenia obliterującego. Ciężkie, zagrażające życiu powikłania skleroterapii (wstrząs związany z uczuleniem, zastrzyk dotętniczy z martwicą)

MEDPHARMA ZOZ S.A.
Al. Jana Pawła II 5a
83-200 Starogard Gdański
NIP 592 18 54 774

**CENTRUM REHABILITACYJNO-
LECZNICZE MEDPHARMA**
ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański

FILIA POLPHARMA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

FILIA BOBOWO
ul. Gdańska 11
83-212 Bobowo

FILIA KALISKA
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska

FILIA OSIECZNA
ul. Dworcowa 6
83-242 Osieczna

praktycznie nie zdarzają się, z drugiej jednak strony w kontekście setek tysięcy przeprowadzanych corocznie na świecie zabiegów skleroterapii, także one odnotowywane były w literaturze fachowej. Potencjalnymi, choć rzadkimi powikłaniami mogą być:

- ból w okolicy poddanej skleroterapii – częste powikłanie zwłaszcza w pierwszych 2 – 3 dniach po zabiegu – niemal zawsze przejściowy
- przebarwienia skóry – u około 7 – 30 % pacjentów. Z reguły ustępuje po okresie do pół roku, niezwykle rzadko dłużej
- rozszerzenie lokalnych naczyń włosowatych – u około 2 – 10 % pacjentów
- lokalna martwica skóry – u mniej niż 1% pacjentów
- zakrzepowe zapalenie żył głębokich lub powierzchownych kończyn dolnych – u około 0,1% pacjentów – przy obliteracji „pajęczków naczyniowych” praktycznie nie występują
- infekcja w miejscu podania sklerozantu – u około 0,001% pacjentów
- inne: krwiak w miejscu i iniekcji, miejscowe reakcje pokrzywkowe, skrzep w świetle żyły

Skleroterapia piankowa pod kontrolą USG

Jest odmianą skleroterapii, którą można zastosować zamiast chirurgicznego leczenia żylaków, pod warunkiem że nie są zbyt duże i rozległe. Skleroterapia piankowa jest to procedura ambulatoryjna, trwająca około 30–50 minut. Wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym u pacjenta w pozycji leżącej. Po wykonaniu znieczulenia pod kontrolą ultrasonografu wprowadza się wenflon (cienki plastikowy cewnik) do zmienionej chorobowo żyły. Najczęściej jest to żyła odpiszczelowa na wewnętrznej powierzchni uda, żyła odpiszczelowa krótka na tylnej powierzchni łydki lub ich główne gałęzie. Przygotowany przed zabiegiem środek obliterujący podaje się przez wprowadzony cewnik, masując kończynę wzdłuż żyły tak aby rozprzecznić pianę na całej jej długości. Środek obliterujący ze względu na zawartość pęcherzyków powietrza jest bardzo dobrze widoczny w USG. Pozwala to na zobaczenie i sprawdzenie czy wszystkie żylaki zostały prawidłowo wypełnione. Środek obliterujący wytwarza stan zapalny w naczyniu, który doprowadza do zwłóknienia i do zamknięcia jego światła. Z obserwacji u około 85% pacjentów wymagany jest tylko jeden zabieg, około 15–18% wymaga dwóch, 1–2% trzech sesji. Liczba zabiegów uzależniona jest od wielkości, szerokości i zakresu żylaków.

Wykonanie skleroterapii piankowej przy prawidłowym zakwalifikowaniu pozwala odstąpić od tradycyjnego zabiegu operacyjnego.

Korzyści skleroterapii piankowej:

- 1) Brak cięcia chirurgicznego – nie ma ryzyka zakażenia miejsca operowanego
- 2) Mniejsze ryzyko uszkodzeń nerwów
- 3) Znieczulenie miejscowe – mniejsze obciążenie dla organizmu w porównaniu do znieczulenia

ogólnego

- 4) Procedura jest prawie bezbolesna
- 5) Lepszy efekt kosmetyczny zaraz po zabiegu – mniejsze zasinienie skóry
- 6) Szybszy powrót do pełnej sprawności po zabiegu
- 7) Mniejsze koszty dla pacjenta

Potencjalne wady skleroterapii piankowej:

- 1) Nie wszystkie poszerzone naczynia żyłne można zakwalifikować do zabiegu
- 2) Uzyskanie pełnego efektu może wymagać więcej niż jednego zabiegu
- 3) Przebarwienia które mogą powstawać przebarwienia na skórze w rzucie leczonych żył – najczęściej znikają po kilku miesiącach do roku, niezwykle rzadko mogą pozostać na stałe (przebarwienia skórne mogą także powstać przy tradycyjnej metodzie.

Wyniki leczenia

W zdecydowanej większości przypadków przeprowadzenie zabiegu skleroterapii osiąga bardzo dobre rezultaty kosmetyczne. Pomimo tego, uzyskanie pożądanego efektu nigdy nie może być zagwarantowane, a w wyjątkowych przypadkach zdarza się, że osiągnany efekt jest gorszy niż przed zabiegiem.

Postępowanie po zabiegu

Chodzenie przez minimum pół godziny, kompresjoterapia – w tym w sposób nieprzerwany 2 – 7 dni, przy dolegliwościach bólowych: zimne okłady oraz paracetamol, kontrola po 1 – 2 tyg.

Rozmowa z lekarzem

Prosimy, aby zapytał/a/ Pan/i/ o wszystko co chciałaby wiedzieć w związku z planowanym zabiegiem skleroterapii.

Przed zabiegiem nie należy stosować balsamów nawilżających skórę.

Zastrzeżenia

pacjenta/tki

MEDPHARMA ZOZ S.A.
Al. Jana Pawła II 5a
83-200 Starogard Gdański
NIP 592 18 54 774

**CENTRUM REHABILITACYJNO-
LECZNICZE MEDPHARMA**
ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański

FILIA POLPHARMA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

FILIA BOBOWO
ul. Gdańska 11
83-212 Bobowo

FILIA KALISKA
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska

FILIA OSIECZNA
ul. Dworcowa 6
83-242 Osieczna

OŚWIADCZENIE PACJENTA

W pełni zrozumiałe(a)m informacje zawarte w tym formularzu oraz przekazane mi podczas rozmowy z lekarzem. Zapewniono mi nieograniczone możliwości pytań i na wszystkie udzielono mi odpowiedzi i wyjaśnień w sposób satysfakcjonujący. Po zapoznaniu się z treścią tego formularza i po rozmowie wyjaśniającej z dr n. med. Aleksandrem Łukasiewiczem spełnione zostały wszelkie wymagania co do informacji na temat:

- Rozpoznania
- Proponowanych oraz alternatywnych metod leczenia
- Dających się przewidzieć następstw zastosowania skleroterapii oraz ryzyka z nią związanego
- Ostatecznych wyników skleroterapii

Bez zastrzeżeń (lub z powyższymi zastrzeżeniami) zgadzam się na przeprowadzenie u mnie zabiegu skleroterapii.

Data i podpis pacjenta/pacjentki

.....

Data i podpis lekarza

.....

MEDPHARMA ZOZ S.A.
Al. Jana Pawła II 5a
83-200 Starogard Gdański
NIP 592 18 54 774

**CENTRUM REHABILITACYJNO-
LECZNICZE MEDPHARMA**
ul. Leśna 1a, Nowa Wieś Rzeczna
83-200 Starogard Gdański

FILIA POLPHARMA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

FILIA BOBOWO
ul. Gdańska 11
83-212 Bobowo

FILIA KALISKA
ul. Nowowiejska 5
83-260 Kaliska

FILIA OSIECZNA
ul. Dworcowa 6
83-242 Osieczna